

REISVERSLAG

ALASKA IN HET VOORJAAR 1 JUNI TOT EN MET 18 JUNI 2002



Max Berlijn
Wilhelminastraat 9
6285 AS Epen (LB) Nederland
berlijn.m@budi.nn.nl

ITENERARY

Za	01-06 Vertrek van Amsterdam via Seattle naar Anchorage
Zo	02-06 In de vroege ochtend gevlogen naar Nome en de rest van de dag gevogeld
Ma	03-06 Nome
Di	04-06 Nome
Wo	05-06 Nome
Do	06-06 Nome
Vr	07-06 Vertek van Nome naar Anchorage in de ochtend en naar Homer gereden.
Za	08-06 Homer. Redelijk slecht weer met een straffe wind (20 mph) en regen.
Zo	09-06 Van Homer naar Anchorage gereden en daar gevogeld.
Ma	10-06 Pribilofs St' Paul vanaf Anchorage in de na-ochtend rechtstreeks gevlogen
Di	11-06 Pribilofs St'Paul
Wo	12-06 In de ochtend nog gevogeld op St'Paul daarna naar Anchorage gevlogen
Do	13-06 In de vroege ochtend via Fairbanks naar Barrow gevlogen en daar gevogeld
Vr	14-06 Barrow
Za	15-06 Barrow
Ma	16-06 Barrow
Di	17-06 In de ochtend naar Anchorage gevlogen
Wo	18-06 Via Seattle naar Amsterdam gevlogen.

Legenda:

*AAAA = Nieuwe soort

AAAA = Leuke soort voor het gebied

De Nederlandse naam is alleen dan gegeven als de vogel een gangbare Nederlandse naam heeft die mij bekend is.

De plekken welke genoemd worden zijn niet verder gespecificeerd daar deze te vinden zijn in het boek:

"A Birdfinding Guide to Alaska van Nick Letheby"

De soortenvolgorde is conform de lijst van de ABA aangevuld met de meest recente wijzigingen.

Alleen indien enigszins relevant wordt de ondersoort vermeld.

Om niet in herhaling te vallen was het weer in tegenstelling tot in andere jaren geweldig met op alle plaatsen behalve in Barrow van ongeveer 40 graden Fahrenheit geen regen en wind (maximaal 12 mijl per meter) van betekenis, vaak zonnig en soms, vooral op St'Paul en Barrow, grondmist maar dit dan voor een niet al te lange duur, tenzij anders aangegeven in de itenerary. In Barrow was het weerbeeld gelijk alleen lag de temperatuur rond de 30F. De nachten waren zeer kort (3 uur) tot niet aanwezig (Barrow) waardoor er het gehele etmaal gevogeld kon worden (maar ja dat WK voetbal moest ook nog bijgehouden worden). Het goede weerbeeld resulteerde in het feit dat ik bij alle (ongeveer 12) vluchten geen minuut vertraging heb opgelopen een ongewoon feit zo heb ik begrepen in Alaska.

Als laatste tip wil ik een essentieel boek noemen bij het voorbereiden van een dergelijke reis: "Moon Handbooks Alaska "Yukon – Avalon Travel", beter en uitgebreider dan de bekende "Lonely Plannet" uitgaven.

DE VOGELSOORTEN

- 001 RED-THROATED DIVER – *gavia stellata*
(roodkeelduiker)
Redelijk algemeen rond Nome en Barrow met vele paartjes op de toendra meertjes en ook overvliegende vogels soms in een soort cirkelende baltsvlucht met een gansachtige roep.
- 002 PACIFIC DIVER – *gavia pacifica*
Enkele paartjes Nome en Barrow en een solitaire vogel te Homer- spit. Allen in zomerkleed.
- 003 GREAT NORTHERN DIVER - *gavia immer*
(ijsduiker)
Redelijk algemeen rond Anchorage en Homer. Ook enkele vogels langs de spit. Hier waren een aantal onvolwassen en niet uitgekleurde vogels bij.
- 004 YELLOW-BILLED DIVER – *gavia adamsii*
(geelsnavelduiker)
04-06 3 ex. in volledig zomerkleed zwemend en later wegvliegend in noordelijke richting op zee nabij Safety Lagoon te Nome. Geweldig gezien met alle kenmerken en de zeer opvallende ietwat omhoog gehouden licht gele snavel.
- 005 RED-NECKED GREBE – *podiceps grisegena*
(roodhalsfuut)
Redelijk algemeen in het gebied rond Anchorage en vooral rond Homer, met verschillende paartjes op de vele meertjes en groepen voor de kust van de spit. De vogels leken groter dan de "europese" vogels.
- 006 NORTHERN FULMAR – *fulmarus glacialis*
(noordse stormvogel)
Ongeveer 30+ ex. in kleine kolonies verspreid over St'Paul. Enkele zeer donkere fase vogels maar de lichte fase was het meest algemeen.
- 007 PELAGIC CORMORANT – *phalacrocorax pelagicus*
Redelijk algemeen op alle kustlocaties met uitzondering van Barrow. en St Paul.
11-06 1 ex. in een groepje Red-Faced vliegend in de avond langs St 'Paul.
- 008 RED-FACED CORMORANT – *phalacrocorax urile*
Redelijk algemeen in kolonies te St'Paul paarsgewijs op de kliffen en ook enkele onvolwassen (bruine) vogels daarbij. Ongeveer 150 ex. gezien. Zeer opvallend met rode washuid en teugel welke over de snavelbasis aansloot en de dubbele kuif. De vogels zijn opvallend groter met dikkere nek dan de pelagic c.
- 009 WHISTLING SWAN – *cygnus columbianus*
(fluitzwaan)
Algemeen te Barrow en vooral te Nome. Op de laatste locatie op 04- 06 een grote concentratie van ongeveer 300 vogels nabij Safety Lagoon welke in de daarop volgende dagen afnam Alle andere vogels waren paartjes op toendra meertjes. Enkele vogels hadden iets meer geel dan de "bekende" gele traan en kwamen in de richting van "de nederlandse" vogel.
- 010 GREATER WHITE-FRONTED GOOSE – *anser albifrons ssp: frontalis*
(kolgans)
15+ vogels vaak paarsgewijs te Barrow in de Toendra.
- 011 EMPEROR GOOSE – *anser canagicus*
(keizergans)
03-06 1 ex. vliegend vanuit het land de zee op te Safety Lagoon.
- 012 LESSER CANADA GOOSE – *branta (canadensis) parvipes*
(middelste canadese gans)
50+ , enkele paartjes en families landinwaarts te Nome vooral langs de Kougarok Road. Ook enkele mix paren met vermoedelijke taverneri gezien. De vogels hadden een nagenoeg witte borst, waren middelgroot maar in structuur gelijk aan een grote canadese gans, met vooral een forse snavel.
- TAVENER'S CANADA GOOSE – *branta (canadensis) taverneri*
(taveners canadese gans)
Redelijk algemeen met tientallen paartjes te Nome en ook rond Anchorage. Het leek alsof deze (onder) soort de meer kale toendra prevereerde in vergelijking met de parvipes. De grote was nogal variabel meer vooral de typische structuur (groot lichaam met korte nek en kleine kop en de vrij donkere borst (hoewel lichteffecten vaak een negatieve rol speelden bij het bepalen ervan) en een gelige keelvlak waren goede kenmerken

- CACKLING CANADA GOOSE – branta (canadensis) minima
(kleinste canada gans)
04-06 3 ex. bij elkaar nabij Safety Lagoon. Vrij ver maar leuk te zien, klassieke vogels, klein, zeer donker (leverkleurig), donkere borst en een gelige keelvlak.
- ALEUTIAN CANADA GOOSE – branta (canadensis) leucopareia
(aleoeten canada gans)
11-06 3 ex. over zee vliegend langs St'Paul en later op het eiland landend. Klein met een zeer opvallende witte nekband (goed zichtbaar in vlucht) en vrij egaal grijs lijf meer opvallende donkere belijning.
- 013 BLACK BRENT - branta (bernicla) nigrigans
(zwarte rotgans)
Redelijk algemeen te Nome en in mindere mate te Barrow in groepen. De vogels kwamen net aan. Opvallend was dat donkere overgang tussen borst en buik redelijk opvallend was in tegenstelling tot de vogels in de winter in nl. Dit zou alles te maken moeten hebben met sleet van de veren.
- 014 MALLARD – anas platyrhynchos
(wilde eend)
10+ ex. te Nome.
- 015 GADWALL – mareca strepera
(krakeend)
05-06 2 ex. te Safety Lagoon te Nome (een goede soort daar)
Redelijk algemeen in het gebied Anchorage-Homer.
- 016 GREEN-WINGED TEAL – anas carolinensis
(amerikaanse wintertaling)
Redelijk algemeen op alle bezochte locaties. Op St'Paul soms samen met crecca waarmee hij weer teruggelumpd is in Amerika.
- 017 COMMON TEAL – anas crecca
(wintertaling)
5 ex verspreid over St'Paul en soms samen met carolinensis. Geen sporen van hybridisatie gezien. Uiteraard alleen mannetjes op naam gebracht.
- 018 AMERICAN WIGEON – mareca americana
(amerikaanse smient)
Redelijk algemeen in alle bezochte gebieden behalve Barrow, vaak paarsgewijs op meertjes, maar ook enkele groepjes langs de kust.
- 019 EURASIAN WIGEON – mareca penelope
(smient)
04-06 1 eerste jaar mannetje te Safety Lagoon Nome
12-06 1 eerste jaars mannetje te St'Paul.
- 020 NORTHERN SHOVELER – anas clypeata
(slobeend)
Zowel te Nome als in Barrow enkele paartjes waargenomen.
- 021 CANVASBACK – aythya valisineria
(grote tafeleend)
04-06 40+ in een groep te Safety Lagoon te Nome
05-06 1 ex. te Safety Lagoon te Nome.
- 022 RING-NECKED DUCK – aythya collaris
(ringsnaveleend)
09-06 1 vrouwtje onderweg van Homer naar Anchorage.
- 023 TUFTED DUCK – aythya fuligula
(kuifeend)
11-06 1 mannetje op een plas te St'Paul.
- 024 GREATER SCAUP - aythya marila
(toppereend)
De algemeenste duikeend op alle locaties behalve Barrow, vaak in paartjes op de meren en plassen maar ook in goepen op doortrek op grotere plassen.
- 025 LESSER SCAUP – aythya affinis
(kleine toppereend)
Redelijk algemeen rond Homer en Anchorage met verschillende paren, vooral te Potters Marsh nabij Anchorage.
10-06 1 vrouwtje te St'Paul op een meertje samen met de Kuifeend.

- 026 COMMON EIDER – *somateria mollissima* ssp: *v-nigra*
(eidereend)
Redelijk algemeen te Nome (in paartjes op de toendra) en rond de Homer-Spit. Ook waargenomen te Barrow maar dan alleen op zee aan de rand van het pakijs.
- 027 KING-EIDER – *somateria spectabilis*
(koningseider)
04-06 1 mannetje te Nome te Safety Lagoon
07-06 1 mannetje langs de Homer Spit tussen de eidereenden en baltsend.
11-06 5 ex allen onvolwassen op zee te St'Paul.
Redelijk algemeen te Barrow in grote groepen langs het pakijs trekkend (vaak onvolwassen vogels) maar ook paartjes op de toendra meertjes.
- *028 **SPECTACLED EIDER** – *somateria fischeri*
(brileider)
04-06 1 vrouwtje te Safety Lagoon te Nome, deze vogel was tot ten minste 06-06 aanwezig.
13-06 6 ex. waarvan drie mannetjes en drie vrouwtjes nabij de meertjes van Freshwater Lake te Barrow. Deze vogels bleven tot 15-06 aanwezig.
15-06 2 mannetjes vliegend over het begin van Gasswel Road. De drie paartjes waren duidelijk op zoek naar een meertje om te broeden.
Alle kenmerken gezien, de mannetjes waren zeer spectaculair en moeilijk te beschrijven. Opvallend was in vlucht en rechtopstaande houding de zeer zwarte onderdelen. De vogels waren kleiner dan verwacht en duidelijk kleiner dan de Koningseiders waarmee ze te vergelijken waren.



- 029 STELLER'S EIDER – *polysticta stelleri*
(stellers eidereend)
13-06 2 ex een mannetje en een vrouwtje aan het begin van Gasswell Road te Barrow. Deze soort neemt erg in aantal af en dit was het enige bekende paartje op dat moment in het gebied.
- 030 AMERICAN (BLACK) SCOTER – *melanitta (nigra) americana*
(amerikaanse zee-eend)
Redelijk algemeen te Nome met dagelijks enkele tientallen ook op zee.
08-06 20 ex. te Homer-Spit.
- 031 WHITE-WINGED SCOTER – *melanitta (fusca) deglandi*
Dagelijks ongeveer 10 ex langs de kust bij Nome.
08-06 4 ex. langsvliegend bij Homer-spit.
- 032 SURF SCOTER – *melanitta perspicillata*
(brilzee-eend)
Een dagelijkse verschijning te Nome en Homer met enkele groepjes van tientallen vogels langstrekkend per dag
- 033 HARLEQUIN DUCK – *histrionicus histrionicus*
(harlekijneend)
Algemeen langs de kust en op de rivieren (vooral te Nome) op alle plaatsen behalve Barrow.

- 034 LONG-TAILED DUCK – *Clangula hyemalis*
(ijseend)
De algemeenste eend op de toendra van Nome en Barrow. Elk meertje had een paartje en ook voor de kust waren grote groepen aanwezig.
- 035 BARROW'S GOLDENEYE – *Bucephala islandica*
(ijslandse brilduiker)
09-06 1 mannetje op een bergmeertje tussen Homer en Anchorage.
- 036 COMMON GOLDENEYE – *Bucephala clangula*
(brilduiker)
05-06 3 ex. nabij Safety Lagoon te Nome.
- 037 COMMON MERGANSER – *Mergus merganser*
(grote zaagbek)
5 ex. in totaal waarvan slechts een ad. mannetje waargenomen allen rond Safety Lagoon te Nome.
- 038 COMMON MERGANSER – *Mergus serrator*
(middelste zaagbek)
Erg algemeen te Nome en samen met de Ijseend de algemeenste eend.
- 039 NORTHERN HARRIER – *Circus (Cyanus) hudsonicus*
06-06 3 ex. langs de Kougurok Road te Nome
09-06 1 vrouwtje tussen Homer en Anchorage.
- 040 GOLDEN EAGLE – *Aquila chrysaetos*
(steenarend)
04-06 2 ex. langs de Kougurok Road te Nome.
06-06 1 ex. zeer mooi vliegend langs de Kagourok Road
Allen adulten.
- 041 BALD EAGLE – *Haliaeetus leucocephalus*
(amerikaanse zeearend)
20+ met name rond Homer maar ook iets ten noorden hiervan. Vele kleden. De vogels fourageerde op dode vissen vooral langs de spit.
- 042 ROCK PTARMIGAN – *Lagopus mutus*
(alpensneeuwhoen)
Redelijk algemeen rond Nome vooral langs de Kougurok Road. De vogels waren nagenoeg allen nog in winterkleed, met een zwarte teugel weinig warmbruin aan de kop (zoals de vele willows al wel hadden). Het geluid en de baltsvlucht is anders dan bij willow welke een heel karakteristiek geluid heeft.
- 043 WILLOW PTARMIGAN – *Lagopus lagopus*
(moerassneeuwhoen)
Redelijk algemeen langs de Kougurok Road vooral in wilgen stukken (zie bovengenoemde soort).
- 044 SANDHILL CRANE – *Grus canadensis ssp: canadensis*
(canadese kraanvogel)
20 ex. in paartjes te Nome waarvan sommige zeer bruine ex., veel roepend.
2 ex nabij Homer-Spit, deze alleen gehoord.
- 045 BLACK-BELLIED PLOVER – *Pluvialis squatarola*
(zilverplevier)
1 ex. gehoord te Barrow.
- 046 AMERICAN GOLDEN PLOVER – *Pluvialis dominica*
(amerikaanse goudplevier)
4 ex. te Nome alle vogels bevonden zich op de hoge toendra vooral langs Kougurok Road.
25+ te Barrow vaak in paartjes op de toendra.
Er was meestal goed een verschil tussen man (fel en mooi getekend) en vrouw (minder gecontrasteerd) te zien.
- 047 PACIFIC GOLDEN PLOVER – *Pluvialis fulva*
(pacifische goudplevier)
20 ex. te Nome allen in paartjes op de lage toendra vooral aan de kust en nabij Safety lagoon. Allen zonder probleem te onderscheiden van de vorige genoemde soort.
- 048 SEMIPALMATED PLOVER – *Charadrius semipalmatus*
(amerikaanse bontbekplevier)
Op alle locaties enkele paartjes op geschikte broed locaties maar nergens algemeen. Op St'Paul ook enkele op trek.

- 049 GREATER YELLOWLEGS – *tringa melanoleuca*
(grote geelpootruiter)
08-06 1 ex. op een plasje nabij Homer-spit
- 050 LESSER YELLOWLEGS – *tringa flavipes*
(kleine geelpootruiter)
01-06 2 ex. een paartje naast het hotel in Anchorage.
09-06 5 ex. te Westchester Lagoon.
- 051 WANDERING TATTLER – *heteroscelus incanus*
10-06 1 eerste zomer op de rotsen te St'Paul. De vogel was niet geheel in zomerkleed met wel brede "schubben" aan de flanken ver naar achteren lopend maar een witte buik. Hij had nagenoeg geen wenkbrauwstreep.
- 052 SPOTTED SANDPIPER – *actitis macularia*
(amerikaanse oeverloper)
01-06 3 ex. nabij het hotel te Anchorage luid roepend en baltsend.
06-06 2 ex. langs de Kougarak Road te Nome, nabij een rivier.
- 053 HUDSONIAN WHIMBREL - *numenius phaeopus*
Algemene broedvogel te Nome.
- 054 BAR-TAILED GODWIT – *limosa lapponica* ssp: *baueri*
(rosse grutto)
Algemeen in broedparen en groepen te Nome. Veel vogels in zomerkleed. Niet op de specifieke kenmerken van deze (onder)soort gelet.
- 055 HUDSONIAN GODWIT – *limosa haemastica*
(rode grutto)
55+ in twee groepen te Westchester Lagoon te Anchorage.
Veel vogels waren niet geheel op kleur.
- 056 RUDDY TURNSTONE – *arenaria interpres*
(steenloper)
Enkele paartjes te Nome en Barrow, niet algemeen.
- 057 SURFBIRD – *aphriza virgata*
09-06 4 ex. in volledig zomerkleed buitendijks te Westchester Lagoon. Zeer mooi te zien foeragerend op het wad.
- 058 ROCK SANDPIPER – *calidris ptilocnemis* ssp: *ptilocnemis*
30+ in paartjes verdeeld over St'Paul in de vele kleine plasjes aldaar. Vaak baltsend en zingend (een ratel zoals vele stints). De intensie van de buikvelk was variabel.
- 059 RED KNOT – *calidris canutus*
(kanoetstrandloper)
7 ex. te Nome gezien op verschillende dagen.
1 ex. te Barrow aan het begin van Gaswell Road. Een goede soort op deze plek.
- 060 SANDERLING – *calidris alba*
(drieteenstrandloper)
15 ex. te Nome verspreid over de gehele periode allen te Safety Lagoon in groepjes (doortrekkers)
1 ex. aan het begin van Gaswell Road te Barrow.
Veel nog in zeer vers broedkleed.
- 061 DUNLIN – *calidris alpina* ssp: *sakhalina* + *pacifica*
(bonte strandloper)
Algemeen als broedvogel te Nome (*pacifica*)
Algemeen als broedvogel te Barrow (*sakhalina*)
Geen opvallende verschillen kunnen constateren tussen de ondersoorten. Veel zingend (eveneens een ratel) en paarsgewijs op de toendra.
- 062 SEMIPALMATED SANDPIPER – *calidris pusilla*
(grijze strandloper)
De algemeenste broedende strandloper zowel te Nome als Barrow. Dagelijks vele paartjes te zien baltsend (met wederom een ratel) bij de vele toendra meertjes in het gebied.
- 063 WESTERN SANDPIPER – *calidris mauri*
(alaska strandloper)
De op een na (grijze) algemeenste broedvogel te Nome. Met veel paartjes in zomerkleed bij de toendrameertjes. De zang was wederom een ratel.
15-06 6 ex. verspreid langs de Gaswell Road.

- 064 LEAST SANDPIPER – *calidris minutilla*
(kleinste strandloper)
12-06 1 ex in zomerkleed, zeer mooi in een plasje op St'Paul.
- 065 WHITE-RUMPED SANDPIPER – *calidris fuscicollis*
(bonapartesstrandloper)
15-06 1 ex. in volledig zomerkleed op de plas aan het begin van Gaswell Road.
- 066 BAIRD'S SANDPIPER – *calidris bairdii*
(bairds strandloper)
Dagelijks tussen de 5 en 10 vogels rond Barrow, soms in poeltjes langs de weg vaak rond de plas aan het begin van Gaswell Road. Allen in zomerkleed. Niet zien baltsen.
- 067 LITTLE STINT – *calidris minuta*
(kleine strandloper)
16-06 1 ex. in zomerkleed, baltsend en territorium verdedigend aan het begin van Gaswell Road. De zang was een hoog "twieeee-twieeee- twieeee".
- 068 RED-NECKED STINT – *calidris ruficollis*
(roodkeelstrandloper)
03-06 1 ex. aan het begin van Safety Lagoon.
04-06 2 ex. bij elkaar in een steltlopergroep halverwege Safety Lagoon.
15-06 2 ex. territorium houdend en zingend aan het begin van Gaswell Road te Barrow.
Allen mooi te zien de zang een opvallend "wouw-wouw-wouw".
- 069 PECTORAL SANDPIPER – *calidris melanotos*
(gestreepte strandloper)
Dagelijks 10+ ex. te Safety Lagoon, soms in kleine groepjes.
Algemeen te Barrow, met vele paartjes en baltsende mannetjes, vliegend met opgeblazen krop en een ezelachtig geluid makend op de toendra meertjes.
- 070 BUFF-BREASTED SANDPIPER – *tryngites subruficollis*
(blonde ruiter)
4 ex, verspreid over twee locaties te Barrow, waarvan een baltsend ex. nabij de zendmasten te Freshwater Lake, en drie ex. nabij het eind van Gaswell Road. De mannetjes baltsen veelvuldig met globaal drie basis gedragingen (op en neer stuiten, vleugel zwaaien en beide vleugels uitwaaiëren).
- 071 SHORT-BILLED DOWITCHER – *limnodromus griseus* ssp: *caurinus*
(kleine grijze snip)
07-06 2 ex. te Potters Marsh.
09-06 10+10+ ex. te Westchester Lagoon op het slik.
- 072 LONG-BILLED DOWITCHER – *limnodromus scolopaceus*
(grote grijze snip)
05-06, 2 ex. te Nome een paartje nabij de monding van de Nome River. Ook zingend gehoord.
Redelijk algemeen in paartjes of in kleine groepjes te Nome allen in zomerkleed.
- 073 WILSON'S SNIPE – *gallinago delicata*
Algemeen te Nome en rond Anchorage. De zang was een van deze soort was een van de karakteristieke geluiden op de toendra.
- 073 RED-NECKED PHALAROPE – *phalaropus lobatus*
(gouwe franjepoot)
Erg algemeen te Nome, en kleine aantallen rond Anchorage en Barrow. Vele paartjes en kleine groepjes op de toendra meertjes. Allen in zomerkleed.
- 074 GREY PHALAROPE – *phalaropus fulicaria*
(rosse franjepoot)
Bijna dagelijks kleine groepjes doortrekkend te Barrow vooral in de "Safety area". Tot 22 bij elkaar, toenemend in aantal tijdens mijn verblijf.
Erg algemeen te Barrow met vele paartjes of kleine groepjes baltsend en zingend op de toendra meertjes, waarbij de vrouwtjes de hoofdrol speelde.
Alle vogels in zomerkleed met vele vrouwtjes maar te Nome waren de mannetjes in de meerderheid.
- 075 POMARINE JAEGER – *stercorarius pomarinus*
(middelste jager)
20+ te Barrow, mooi te zien vaak paarsgewijs op de toendra in beide kleurvarianten.
Eenmaal een mannetje Rosse Franjepoot zien vangen en eten.

- 076 PARASITIC JAEGER – *stercorarius parasiticus*
(kleine jager)
40+ te Nome, allen in paartjes op de toendra en beide kleurfasen. 10+ te Barrow, in paartjes op de toendra.
- 077 LONG-TAILED JAEGER – *stercorarius longicaudus*
(kleinste jager)
Redelijk algemeen op de toendra te Nome, en daar de algemeenste jager vaak in paartjes en baltsvluchten zien uitvoeren. 5 ex. verspreid over de periode te Barrow allen op doortrek.
- 078 BONAPARTE' S GULL – *larus philadelphia*
(kleine kokmeeuw)
08-06 3 ex. rond Homer-spit, ook als broedvogel daar aanwezig in de bomen.
09-06 75 ex. op het wad te Westchester Lagoon Anchorage, vele in onvolwassen kleeed.
- 079 BLACK-HEADED GULL – *larus ridibundus*
(kokmeeuw)
11-06 1 eerste zomer tussen de drieteenmeeuwen te St'Paul op een zoetwatermeertje.
- 080 MEW GULL – *larus (canus) brachyrhynchus*
De algemeenste meeuw in bijna alle bezochte gebieden behalve St'Paul, veelal broedend in kleine losse kolonies soms in bomen.
- 081 VEGA GULL – *larus (argentatus) vegae*
8 ex. te Nome tussen de Grote Burgemeesters vooral rond de Safety Lagoon. Op een na allen adulten. Een overvliegende onvolwassen vogel gezien. Optisch gelijk aan "onze" zilvermeeuw.
- 083 GLAUCOUS GULL – *larus hyperboreus*
(grote burgemeester)
Algemeen als broedvogel op de toendra van Nome en Barrow maar vooral te Nome vele broedparen en onvolwassen overzomerende vogels.
- 084 GLAUCOUS-WINGED GULL – *larus glaucescens*
(beringmeeuw)
Redelijk algemeen rond Homer(spit) en Anchorage.
- 085 SLATY-BACKED GULL – *larus schistisagus*
07-06 1 ex. een eerst zomer te Homer-Spit. De vogel had donkere vleugelpunten.
- 086 BLACK-LEGGED KITTIWAKE – *rissa tridactyla*
(drieteenmeeuw)
Algemeen dagelijks langs de kust trekkend in groepen in noordoostelijke richting te Nome. Algemeen rond Homer-Spit (broedend op rotsen voor de kust) Algemene broedvogel te St'Paul.
- *087 RED-LEGGED KITTIWAKE - *rissa brevirostris* ssp: *pollicaris*
Dagelijks tot maximaal 60+ te St'Paul, waarvan enkele op het nest langs de kliffen tussen de hierboven genoemde soort, maar de meeste op zoetwatermeertjes badend of langsvliegend. Bijna allen adult maar ook enkele eerste zomers te zien. Makkelijk te onderscheiden door de rode poten, dikke stierennek en ronde duivenkop. Mantel donkerder grijs en in vlucht donkerdere ondervleugels met minder contrasterende zwarte vleugelpunten. De eerste zomers zonder grijze achterkop.
- 088 SABINE'S GULL – *xema sabini*
(vorkstaartmeeuw)
130+ in een groep op het pakijs rond de Safety Lagoon brug. De vogels waren de gehele periode aanwezig maar hun aantal nam wel af met het verdwijnen van het ijs. Allen in schitterend zomerkleeed. 14-06 3 ex. vliegend naar west te Barrow over het pakijs.
- 089 IVORY GULL – *pagophila eburnea*
(ivoormeeuw)
04-06 1 eerste zomer mooi te zien tussen de grote burgemeesters nabij de eerste brug over de Safety Lagoon. De vogel was nagenoeg wit met maar enkele zwarte vlekjes. De kop was nagenoeg wit zonder een duidelijke "vieze" snavelbasis. De vogel was de gehele avond aanwezig.
- 090 ARCTIC TERN – *sterna paradisaea*
(noordse stern)
Erg algemeen op alle bezochte locaties behalve St'Paul. Vele broedpaartjes en trekkende groepjes.

- *091 **ALEUTIAN TERN** – *sterna aleutica*
(aleoetenstern)
15 + ex. te Nome waarvan twee paartjes in een kolonie noordse sterns bij de brug van de Nome River, en losse ex. bij de brug van Safety Lagoon.
- Mooi te zien en te horen (een steltloperachtig "pjuuk-pjuuk"). De vogels waren verassend moeilijk te herkennen op grote afstand (bijna gelijk in kleur als noordse). Vooral het witte voorhoofd viel op.
- 092 **COMMON MURRE** – *uria aalge ssp: inornata*
(pacifische) zeekoet)
Algemeen te Homer-Spit (zeer algemeen hier vanwege de broed kolonies in de buurt), St' Paul en in mindere mate te Nome.
- 093 **THICK-BILLED MURRE** – *uria lomvia ssp: arra*
(kortbekzeekoet)
15+ ex. te Nome trekkend in de groepjes zeekoeten langs Cape Nome op verschillende dagen.
Algemene broedvogel te St'Paul met vele honderden ex. in kolonies gemengd met Zeekoeten.
Mooi in zomerkleed met de witte (niet altijd opvallende) snavellijn. Bij goed licht redelijk in vlucht te onderscheiden van Zeekoeten door de zwarte bovendelen en dikkere structuur.
- 094 **BLACK GUILLEMOT** – *cepheus grylle ssp: mandtii*
(zwarte zeekoet)
5 ex. op twee dagen (mogelijk dezelfde) in een klein wak nabij Point Barrow te Barrow, allen in zomerkleed.
- 095 **PIGEON GUILLEMOT** – *cepheus columba*
30+ rond Homer-Spit allen in zomerkleed.
- 096 **MARbled MURRELET** – *brachyramphus marmoratus*
40 ex. dagelijks vooral langstrekkend te Homer-Spit. Alle vogels in zomerkleed, erg donker met donkere buik en onderstaartdekveren wel wat vlekking op de buik. Geen vogels terplaatse zittend.
- *097 **KITTLITZ'S MURRELET** – *brachyramphus brevirostris*
06-06 2 ex. vliegend langs Cape Nome.
08-06 5 ex. in de avond vliegend langs Homer-Spit.
09-06 3 ex. zeer mooi vliegend langs Homer-Spit en in de naochtend
15+ ex in paartjes zwemmend langs de westkant van Homer- Spit.
In vlucht met goed licht (en zon) makkelijk te determineren door de "gouden" kleur op de bovendelen, contrasterend met de donker bruine vleugels, witte (redelijk scherp) afgescheiden buik en onderstaartdekveren. In zit alleen met donker licht gezien en toen gedetermineerd op vlekkelig lichte uiterlijk, witte onderstaartdekvern, lichte gevlekte keel en vuil grijswitte scapulars.
- 098 **ANCIENT MURRELET** – *synthliboramphus antiquus*
(zilveralak)
12-06 2 ex. mooi ter plaatse tussen een groep Crested Auklets nabij een van de zeevogelkolonies op zee, goed dicht bij.
- *099 **PARAKEET AUKLET** – *aethia psittacula*
100+ verdeelt over de zeevogel kolonies op St'Paul. Allen in zomerkleed. Mogelijk meer vogels gezien maar grote aantallen alken op grote afstand niet gedetermineerd. De vogels waren in losse paartjes over de zeevogelkolonies verdeeld.
- 100 **CRESTED AUKLET** – *aethia cristatella*
(kuifalk)
05-06 1 ex. langs Cape Nome in noordelijke richting.
150+ verdeeld over de zeevogelkolonies te St'Paul. Allen in zomerkleed. Deze soort zat in kleine groepjes tussen de andere zeevogels en waren de laatste alkachtige welke nog nestplaatsen aan het zoeken waren (de andere soorten hadden die al). Vaak ook in groepjes op zee voor de kust.

- *101 **LEAST AUKLET** – *aethia pusilla*
Erg algemeen in soms grote groepen te St'Paul, meer dan 1000 ex. gezien. De vogels broeden voornamelijk op lagergelegen stenen wallen en dijken maar ook hoog op kliffen. De vogels maakte veel moeilijk te beschrijven geluiden. Ze waren erg variabel in kleur op de onderdelen, van geheel grijs tot geheel wit en alles wat daartussen zit.
- 102 **RHINOCEROS AUKLET** – *cerorhinca monocerata*
09-06 2 ex. langs vliegend te Homer-Spit.
- *103 **HORNED PUFFIN** – *fratercula corniculata*
15+ dagelijks tijdens een uur zeetrek tellen te Cape Nome.
20+ vanaf Homer-Spit, broedvogels uit de omgeving.
250+ verspreid over de zeevogelkolonies te St'Paul, vaak paarsgewijs, en niet echt algemeen in de kolonies. Als in de boeken en vaak mooi te zien.
- 104 **TUFTED PUFFIN** – *fratercula cirrhata*
(papegaaialk)
20+ vanaf Homer-Spit, broedvogels uit de kolonie.
200+ verspreid over de broedvogelkolonies te St'Paul. Mooi te zien in paartjes zittend en vliegend.
- 105 **SHORT-EARED OWL** – *asio flammeus*
(velduil)
2 ex. op verschillende dagen te St'Paul.
- 106 **SNOWY OWL** – *nyctea scandiaca*
(sneeuwuil)
25 in totaal op de toendra van Barrow. Allen paartjes van volwassen vogels. Geen onvolwassen gezien. De vogels zaten vaak net uit de wind op de uitkijk op de toendra. Vele mooie witte mannetjes. Ook zien jagen en in gedrag een beetje op een Buizerd lijkend. ook op de grond zien lopen op zoek naar muizen. Soms goed te benaderen. Een van de hoogste punten van Barrow.
- 107 **RUFIOUS HUMMINGBIRD** – *selasphorus rufus*
09-06 3 ex. bij een feeder bij een restaurant op de weg van Homer naar Anchorage, waarvan 2 mooie mannetjes.
- 108 **BELTED KINGFISHER** – *ceyle alcyon*
(bandijsvogel)
09-06 1 ex. onderweg van Homer naar Anchorage.
- 109 **NORTHERN SHRIKE** – *lanius excubitor ssp: invictus*
(klapekster)
06-06 1 ex. langs Teller Road te Nome.
09-06 1 ex. in de avond midden in Anchorage in een dennenboom.
- 110 **STELLER'S JAY** – *cyanocitta stelleri*
09-06 1 ex. onderweg van Homer naar Anchorage.
- 111 **GREY JAY** – *perisoreus canadensis ssp: pacificus*
09-06 3 ex. onderweg van Homer naar Anchorage, met donkere kruin en nek.
- 112 **BLACK-BILLED MAGPIE** – *pica hudsonia*
Algemeen op het vaste land.
- 113 **NORTHWESTERN CROW** – *corvus caurinus*
Algemeen langs de kust van het vaste land van Alaska met neme te Homer.
- 114 **COMMON RAVEN** – *corvus corax*
(raaf)
Algemeen in alle bezocht gebieden behalve St'Paul.
- 115 **TREE SWALLOW** – *tachycineta bicolor*
Algemeen te Nome en het vaste land behalve Barrow.
- 116 **VIOLET-GREEN SWALLOW** – *tachycineta thalassina*
Redelijk algemeen te Anchorage en de buitenwijken daarvan. Leuk te zien vaak roepend in groepen foeragerend.
- 117 **BANK SWALLOW** – *riparia riparia*
(oeverzwaluw)
10 in een kleine kolonie langs de Kougarak Road te Nome.
- 118 **CLIFF SWALLOW** – *petrochelidon pyrrhonota*
5 ex. langs de Kourarak Road te Nome verspreid over de periode.
- 119 **BOREAL CHICKADEE** – *poecile husonicus*
09-06 1 ex. op een picknickplaats tussen Homer en Anchorage, mooi te zien.

- 120 WINTER WREN – troglodytes troglodytes ssp: alascensis
(winterkoning)
5 ex. te St' Paul verspreid over het gehele verblijf.
- 121 AMERICAN DIPPER – cinclus mexicanus
09-06 1 ex. onderweg van Homer naar Anchorage.
- 122 GOLDEN-CROWNED KINGLET – regulus satrapa
09-06 1 ex. te Homer mooi gezien.
- 123 GREY-STREAKED (SPOTTED) FLYCATCHER – muscicapa griseisticta
11-06 1 ex. te St'Paul in de "Quarry". Zeer mooi gezien zittend op stenen aldaar. Ontdekt door een van de leiders om 22.30. Ook de volgende dag nog aanwezig. Het eerste geval van deze soort buiten Attu voor de US dus voor veel mensen nieuw (inclusief John Dunn)
- 124 SIBERIAN RUBYTHROAT – lusciniya calliope
(roodkeelnachtegaal)
12-06 1 mannetje (mogelijk eerste zomer vanwege enkel lichte toppen aan de vleugeldekveren) in het dorp te St'Paul. In de ochtend door mijzelf gevonden op weg naar het ontbijt op zang (!?!?). De vogel zat gedurende de gehele dag te zingen op het hek van de opslagtanks. Vaak de mooi rode keel "showend"
- 125 BLUETHROAT – lucinia svecica ssp: svecica
(roodsterblauwborst)
3 ex. mooi te zien gedurende verschillende bezoeken aan Kougarok Road. Mooi te zien zingend.
- 126 GREY-CHEEKED THRUSH – catharus minimus ssp: aliciae
(grijswangdwerglijster)
Algemeen in alle gebieden met struiken en kleine (dwerg) bomen. Mooi zingend (vrij karakteristieke melodie, goed te leren). Deed qua uiterlijk soms denken aan een Krekelzanger.
- 127 AMERICAN ROBIN – turdus migratorius
(roodborstlijster)
Redelijk algemeen te Nome (in de begroeide gedeelte) en rond Homer en Anchorage.
- 128 YELLOW WAGTAIL – motacilla flava ssp tschutschensis
(gele kwikstaart)
Algemeen te Nome. De vogels leken een beetje op een kruising tussen een Noordse (donkere oorstreek) en een "gewone" gele kwik met veel strepen op de onderdelen.
- 129 AMERICAN PIPIT – anthus rubescens ssp: rubescens
(amerikaanse waterpieper)
06-06 2 ex. langs Teller Road nabij een nest.
- 130 ORANGE CROWNED WARBLER – vermivora celata ssp: celata
Redelijk algemeen te Nome en rond Anchorage en Homer.
Meestal zingend te ontdekken, in Nome in de meest begroeide gebieden.
- 131 TOWNSEND'S WARBLER - dendroica townsendi
09-06 5 ex allen zingende mannetjes rond Homer.
- 132 BLACKPOLL WARBLER – dendroica striata
04-06 1 mannetjes zeer mooi territorium houdend en zingend nabij Nome Jail.
- 133 YELLOW WARBLER – dendroica petechia
Redelijk algemeen te Nome in de begroeide gebieden.
- 134 WILSON'S WARBLER – wilsonia pusilla
Algemeen te Nome met vele zingende mannetjes in de begroeide gebieden.
- 135 NORTHERN WATERTHRUSH – seiurus noveboracensis
Redelijk algemeen in de begroeide (vochtige) gedeelte van de toendra te Nome.
Redelijk algemeen rond Homer.
Deze soort wordt vaak per ongeluk gedetermineerd als NoBo te Nome.
- 136 AMERICAN TREE SPARROW – spizella arborea
Dagelijks 5+ in de begroeide gedeelten te Nome.
- 137 (RED) FOX SPARROW – passerella iliaca ssp: zaboria
6 ex. verspreid over de periode te Nome.
- 138 SAVANNAH SPARROW – passerulus sandwichensis ssp: sandwichensis
Algemeen in alle bezochte gebieden ook op de Pribilofs.
- 139 LINCOLN'S SPARROW – melospiza lincolni
07-06 1 ex. te Potters Marsh nabij Anchorage.

- 140 WHITE-CROWNED SPARROW - *zonotrichia leucophrys* ssp : *gambelii*
(witkruingors)
Algemeen te Nome, de algemeenste gors aldaar.
- 141 GOLDEN-CROWNED SPARROW – *zonotrichia atricapilla*
Dagelijks 5+ in speciaal begroeide gebieden vooral langs Kougarak Road te Nome. Mooie adulte mannetjes. De zangmelodie was karakteristiek en makkelijk te onthouden.
- 142 LAPLAND LONGSPUR - *calcarius lapponicus*
(ijsgors)
Algemeen op de kale en schaars begroeide toendra te Nome en Barrow en St'Paul, met vele paartjes en zingende mannetjes in zangvlucht. De zang is erg melancholisch.
- 143 SNOWBUNTING – *plectrophenax nivalis*
(sneeuwgorst)
Redelijk algemeen te St'Paul vooral in de gebieden met veel steen (vooral de Quarry)
Algemeen te Barrow, vooral in het plaatje zelf broedend in de gebouwen.
- *144 **MCKAY'S BUNTING** – *plectrophenax hyperboreus*
10-06 1 vrouwtje gepaard met een mannetje Sneeuwgorst in een stenen kloof in de Quarry te St'Paul. Zeer mooi gezien jongen voerend. De vogel was zeer wit met een nagenoeg witte kruin, bijna witte mantel met zwakke zwarte pijlvormige streping, witte vleugeldekveren, zwarte duimvleugel en tertials, zwarte achterrand van de handpennen (minder dan bij Sneeuwgorst) en witte staart met enkele zwarte punten aan de centrale staartveren. Geen enkele buff gekleurde veren zoals bij vrouwtjes Sneeuwgorst. De vogel leek eigenlijk meer op een mannetje dan op een vrouwtje McKay's.



- 145 RED-WINGED BLACKBIRD – *agelaius phoeniceus*
07-06 3 ex. te Potter Marsh, een redelijke zeldzaamheid voor Alaska.
- 146 RUSTY BLACKBIRD – *euphagus carolinus*
07-06 1 ex. te Potter Marsh.
- 147 GREY-CROWNED ROSY-FINCH – *leucosticte tephrocotis* ssp: *umbrina*
Redelijk algemeen verspreid over St'Paul. Vrij groot en vaak broedend in stenen holtes of onder daken van gebouwtjes.
- 148 HOARY REDPOLL - *carduelis hornemanni* ssp: *exilipes*
(witstuitbarmsijs)
Algemeen te Nome en Barrow, in kleine groepjes of in paartjes. De vogels waren redelijk luidruchtig en allen makkelijk te herkennen.

ZOOGDIEREN:



AMERICAN BEAVER – *castor canadensis* – 1 ex. Nome River.

ARCTIC FOX – *alopex lagopus* – Algemeen te Barrow en St'Paul.

POLAR BEAR – *ursus martimus* – 2 ex op het pakijns te Barrow, een in de ochtend en een in de middag, waarvan een mooi redelijk dichtbij.

MOOSE – *alces alces* – Algemeen te Nome.

CARIBOU – *rangifer tarandus* – Enkele kuddes te Nome.

MUSKOX – *ovibos moschatus* – Een stier dichtbij in langs Kougarok Road (erg dichtbij) en een kudde langs dezelfde weg.

MOUNTAIN GOAT – *oreamnos americanus* – 2 ex. net ten zuiden van Anchorage op een rotswand.

NORTHERN FUR SEAL – *callorhinus ursinus* – Algemeen langs de kust van de Pribilofs, met vele "beachmasters"

HARBOR SEAL – *phoca vutulina* – Enkele rond St'Paul.

-----,-----